Eclair
25WG اكلير

E:CLAIR 25WG

Eclair 25WG
25WG اكلير

Eclair
25WG اكلير

Eclair
Eclair
25WG اكلير

ECLAIR 25WG

Composition Chimique : 25 % Thiamethoxame

Formulation : Granulé

Source : GSP CROP SCIENCE LIMITED

Catégorie : Insecticide Systémique

Mouche Blanche sur Poivron à la dose de 40 gr/hl --- DAR = 3 Jours

Pucerons sur Melon à la dose de 20 gr/hl --- DAR = 3 Jours

Mode d'action

Le Thiamethoxame ou thiamétoxam (ISO) est une molécule chimique de la famille des néonicotinoïdes (une famille d'insecticides neurotoxique pour les invertébrés, tout comme la clothianidine et l'imidaclopride.

Il est utilisé comme insecticide systémique sur plusieurs cultures maraichères et arboricole. Aux doses de toxicité aiguë, ce composé bloque le transfert d'électrons entre cellules nerveuses, ce qui conduit à une paralysie puis à la mort de l'insecte et d'autres invertébrés tels que les arthropodes phytophages.

Aux doses de toxicité subaiguës, il modifie le comportement de l'abeille. Il pourrait participer au phénomène de régression de certaines espèces pollinisatrices ; en particulier des abeilles à miel.

Mode d'action

Le Thiamethoxame est un produit systémique, transporté dans la plantule depuis la racine jusqu'aux organes en croissance.
Absorbé par l'insecte, il agit sur son système nerveux.


T = 0
T + 30 minutes
T + 24 heures
Action principale par ingestion
Arrêt de la locomotion, arrêt de la nutrition puis mort du ravageur.



Mode d'action

Après 15 minutes, l'insecte arrête déjà de se nourrir et meurt endéans les 1 ou 2 jours après avoir mordu ou piqué la plante traitée. Parmi les atouts du Thiamethoxame, on peut citer sa solubilité dans l'eau qui lui garanti une bonne efficacité, même en conditions sèches.



NOM COMMERCIAL	SUBSTANCE ACTIVE	DOSE	DAR (jrs)	Effets sur les bordones				Ravageurs							FOURNISSEUR	LUTTE INEGRE
				Non compatible	Compatible Fermeture des		Retiré les ruches	Acariens	Aleurodes	Pucerons	Thrips	Mineuses	Noctuelles	Tuta Absoluta		
ACTARA	Thiamethoxam	20g/hl	3	x					X						SYNGENTA	Non
ADMIRAL 10 EC	Pyriproxyfène	25cc/hl	3			x			X						BAYER MAGHREBE	Oui
AKOPRIDE 200 SL	Imidacloprid	50cc/hl	3	x					X						SAOAS	Non
APPLAUD 25 SC	Buprofézine	100cc/hl	3			x			X						MARBAR	Oui
AVAUNT 150 SC	Indoxacarbe	25cc/hl	3			x							X		AGRIMATCO	Oui
CALYPSO 480 SC	Thiacloprid	30cc/hl	3				x		X						BAYER MAGHREBE	Oui²
CONFIDOR 200 OD	Imidacloprid	50cc/hl	3	x					X						BAYER MAGHREBE	Non
CONFIDOR 200 SL	Imidacloprid	50cc/hl	3	x					X						BAYER MAGHREBE	Non
DECIS 25 EC	Deltamethrine	30cc/hl	3				x			X			X		BAYER MAGHREBE	Non
DELTRIN 25 EC	Deltamethrine	30cc/hl	3				x			X			X		BAYER MAGHREBE	Non
DYNAMEC 018 EC	Abamectine	25cc/hl	3			x						X			SYNGENTA	Non
FASTAC 5	Alpha-cypermethrine	20cc/hl	3	x									X		AMAROC	Non
FLECHE	Abamectine	25cc/hl	3			x						X			ALFACHIMIE	Non
JADARME 25 WP	Methomyl	150g/hl	3	x					X	X		X			SAOAS	Non
LANNATE 20 L	Methomyl	150 à 250 cc/hl	3	x					X	X			X		AMAROC	Non
LANNATE 25 WP	Methomyl	180 à 200 g/hl	3	x					X	X			X		AMAROC	Non
LIMOCIDE	Essence d'orange	0,4 l/hl	1						X						SAOAS	?
MAVRIK 2F	Tau-Fluvalinate	50cc/hl	3				x		X						SAOAS	Non
MOSPILAN 20 SP	Acétamipride	30g/hl	3			x						X			CALIMAROC	Non
NEEMIX 4,5	Azadiractin	40cc/hl	3		x				X						AST	Oui*
NEXTER WP	Pyridabène	20g/hl	3			x			X						BASF MAGHREB	Oui*
NUPRID 200 SC	Imidacloprid	50cc/hl	3	x					X						AMAROC	Non
OBERON 240 SC	Spiromésifen	60cc/hl	3		x			X	X						BAYER MAGHREBE	Oui
OIKOS	Azadiractin	70cc/hl	3		x				X				X		ALFACHEMIE	Oui*
OSMOSE	Lambda-Cyhalothrine	25cc/hl	3	x									X		ALFACHIMIE	Non
PROCLAIM 05 SG	Emamectine Benzoate	250g/ha	7										X		SYNGENTA	?
SALVADOR 24 SL	Methomyl	250cc/hl	3	x					X	X			X		CPCM	Non
SALVADOR 25 WP	Methomyl	150g/hl	3	x					X	X			X		CPCM	Non
TAKUMI 20 WG	Flubendiamide	50 cc/hl	3									X	X		MARBAR	?
TRACER 480 SC	Spinosade	75cc/hl	3				x					X			PROMAGRI	Oui
TRACER 480 SC	Spinosade	30cc/hl	3				x						X		PROMAGRI	Oui
VITNAM 20	Methomyl	150 à 250cc/hl	3	x					X	X			X		SAOAS	Non
VOLIAM TARGO	Abamectine + Chlorantraniliprole	0,5 L/ha	3			x								X	SYNGENTA	Non+?
WARRANT 200 SL	Imidacloprid	50 cc/hl	3	x					X						MARPHYT	Non

Positionnement sur le Marché

(Culture, Dose, Zone, Mode d'emploi)

Cultures maraichères (Melon, Poivron, Piment, Tomate, Aubergine et concombre)

Délai avant Récolte (DAR) : 3 jours

Nombre d'application maximum : 1

Mode d'emploi : Application en préfloraison. Respecter un délai de 21 jours entre l'application et le début de la floraison.

Spectre d'action :

Aleurodes (Bemisia tabacci) et (Trialeurodes vaporariorum) : sous serre : efficace sur le premier stade larvaire des aleurodes, s'intègre dans un programme de lutte intégrée. Application avant les lâchers des auxiliaires (respecter les délais des fournisseurs d'auxiliaires). Dose de 0.4 Kg/Ha

Pucerons : 0.2 Kg/Ha

Positionnement sur le Marché

(Culture, Dose, Zone, Mode d'emploi)

Agrumes

Nombre d'application maximum : 2

Mode d'emploi : Application en préfloraison. Ne pas traiter prés des ruches.

Spectre d'action :

Aleurodes : 0.2 Kg/Ha

Pucerons : 0.2 Kg/Ha

Mineuses : 0.2 Kg/Ha

Positionnement sur le Marché

(Culture, Dose, Zone, Mode d'emploi)

Arbres fruitiers

Nombre d'application maximum : 1

Spectre d'action :

Puceron lanigère : 0.3 Kg/Ha / Période d'utilisation : 1 application en post-floraison au tout début des infestations.. En cas de remontée de population, il est nécessaire de procéder à un deuxième traitement avec un autre produit.

Quelques périodes d'utilisation du produit

Ravageur Ciblé	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep
Mineuse des feuilles/Agrumes												
Aleurodes/Agrumes												
Pucerons/ Agrumes												
Pucerons/Arbres fruitiers Pépins												
Pucerons/Arbres fruitiers Noyau												
Mouche Blanche/Tomate												